


Rezultate anterioare:



Potențial productiv foarte mare și conținut ridicat în ulei, pentru un profit ridicat

Contact:

Dr. ing. Danut Petru Simioniuc
Str. Rediu Tatar nr.10,
Bl 482 C, ap. 2, Parter
RO - 700546, Iasi
Tel.: 004 / 02 32 21 85 65
Mobil: 004 / 07 23 82 76 21
Fax: 004 / 03 32 56 98 85
simion@univagro-iasi.ro
www.sd-seeds.ro
www.dieckmann-seeds.de

Sugestiile din acest prospect sunt bazate pe incercari in camp si sunt influentate de particularitatile locale. O garantie a succesului nu poate fi acordata.

00 Hibrid de rapiță de toamnă

Hycolor

Fără acid erucic
și conținut scăzut
în glucozinolați

00 Hibrid de rapiță de toamnă

Hycolor

- Rezistență foarte bună la boli
- Performanțe foarte bune și în condiții dificile sau semănat tardiv
- Creștere foarte rapidă în primele faze de vegetație

Caracteristici de calitate:

Conținut în ulei	mediu-ridicat
Producție de ulei	mare – foarte mare
Conținut în glucozinolați	scăzut
Conținut în proteină brută	mediu
MMB	medie
Eficiență economică	ridicată

Caracteristici agronomice:

Înflorire	timpurie
Precocitate	timpurie - medie
Talia plantelor	medie
Rezistență la iernare	bună
Rezistență la cădere	bună
Capacitatea de producție	ridicată - foarte ridicată

Toleranța la boli:

Phoma	medie
Sclerotinia	medie
Alternaria	redusă - medie



Recomandări tehnologice:

Amplasarea:

Creșterea rapidă din primele faze de vegetație, vitalitatea excelentă combinată cu o comportare favorabilă în perioada coacerii, permit utilizarea hibridului Hycolor în toate zonele în care se cultivă rapița de toamnă.

Semănatul:

Semănatul se va efectua în funcție de condițiile locale, de regulă între 12-30 august, cu o norma de semănat de 35-45 de semințe germinabile pe metrul pătrat. Poate fi semănat și în prima parte a lunii septembrie, datorită capacității acestui hibrid de a se preta la un semănat mai tardiv. Ca urmare a dezvoltării foarte viguroase din primele faze de vegetație, se recomandă alegerea valorii minime a normei de semănat.

Regulatorii de creștere:

Regulatorii de creștere se vor aplica dacă este necesar, primăvara înainte ca înălțimea plantelor să fie de 20-30 cm (0.4 - 0.6 l / ha tebuconazol sau 0.5 - 0.8 l / ha metconazol, conform instrucțiunilor de aplicare).

Fertilizarea:

Azotul se va aplica primăvara, la începerea vegetației (aproximativ 50% din cantitatea totală), la începerea alungirii plantelor (40%) și la începerea înfloritului (10%), doză care, după cercetările noastre, permite creșterea MMB.

Protecția plantelor:

Se recomandă tratamentul în toamnă cu Tebuconazol sau Metoconazol. Pentru valorificarea potențialului ridicat de producție, se vor efectua tratamentele de combatere a bolilor Sclerotinia, Phoma și Alternaria, în funcție de condițiile specifice apariției acestora.